

FUMAGRI

EFFISAFE

NOWA
FORMUŁA

Skuteczna dezynfekcja


Działa przeciwko kokcydiozie
(*Eimeria tenella*) oraz glistcie świńskiej
(*Ascaris Suum*).

- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa oraz różnorodność aplikacji
- Skuteczność bakteriobójcza, drożdżakobójcza, grzybobójcza i wirusobójcza w sektorze weterynaryjnym
- Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, sprzętu używanego do hodowli, transportu, ubrań oraz obuwia używanego na fermie, itd.



FUMAGRI

EFFISAFE



Dezynfekcja powierzchni i sprzętu



OPRYSK

PIANOWANIE

NAMACZANIE

Wstępnie oczyścić powierzchnie i sprzęt, który ma zostać zdezynfekowany.

Przygotuj roztwór według poniższych zaleceń FUMAGRI EFFISAFE i nałóż w ilości 300ml na m² (w zależności od powierzchni) metodą natrysku, pianowania lub poprzez namaczanie w temperaturze minimum 10°C:

- 1% bakteriobójcze, drożdżobójcze, wirusobójcze / ≥ 30 min.
- 3% grzybobójcze / ≥ 30 min.
- 1% prątkobójcze oraz 2% grzybobójcze / ≥ 60 min.

Roztwór dezynfekujący zużyć w ciągu 24 godzin od przygotowania.

Dezynfekcja obuwia, kół oraz pojazdów przeznaczonych do transportu



OPRYSK

PIANOWANIE

NAMACZANIE

Przygotuj roztwór według poniższych zaleceń i nałóż poprzez natrysk pod niskim ciśnieniem lub pianowanie na powierzchnie samochodów ciężarowych do transportu zwierząt i koła lub użyj poprzez zanurzenie kół.

- 2% Działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze, wirusobójcze / ≥ 5 min.

Codziennie odnawiaj roztwór dezynfekcyjny.

SKUTECZNOŚĆ BAKTERIOBÓJCZA



EN14349 / 10°C / małe zanieczyszczenie:

- **2%/30 min.:** *Campylobacter jejuni*
- **2%/5 min.:** *Enterococcus hirae*, *Proteus hauseri*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*

EN1656 / 10°C / małe zanieczyszczenie

- **0,5%/1 min.:** *Proteus vulgaris*
- **1%/1 min.:** *Staphylococcus aureus*
- **2%/1 min.:** *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*
- **1%/5 min.:** *Enterococcus hirae*, *Proteus hauseri*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus Aureus*
- **0,2%/30 min.:** *Proteus hauseri*
- **0,5%/30 min.:** *Enterococcus hirae*,
- **1%/30 min.:** *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus ureus*

SKUTECZNOŚĆ WIRUSOBÓJCZA



EN14675 / 10 °C / małe zanieczyszczenie

- **1,5%/1 min.:** *Bovine Enterovirus type 1 (ECBO)*
- **0,5%/30 min.:** *Bovine Enterovirus type 1 (ECBO)*, *Avian Influenza Virus*
- **0,75%/30 min.:** *Classical Swine Fever's disease virus*
- **1%/1 min.:** *African swine fever virus (ASF)*

EN14675 / 10 °C / duże zanieczyszczenie

- **1%/5min.:** *Bovine Enterovirus type 1 (ECBO)*
- **2%/1 min.:** *African swine fever virus (ASF)*

EN17122 / 10°C / małe zanieczyszczenie

- **0,2%/30 min.:** *Avian Influenza Virus*

SKUTECZNOŚĆ GRZYBOBÓJCZA



EN16438 / 10°C / małe zanieczyszczenie

- **1%/60 min.:** *Aspergillus fumigatus*
- **2%/60 min.:** *Aspergillus brasiliensis*
- **3%/30 min.:** *Aspergillus brasiliensis*

EN1657 / 10°C / małe zanieczyszczenie

- **2%/30 min.:** *Aspergillus brasiliensis*

SKUTECZNOŚĆ DROŹDŻOBÓJCZA



EN16438 / 10°C / małe zanieczyszczenie

- **2%/1 min.:** *Candida albicans*
- **1%/5 min. i 30 min.:** *Candida albicans*

EN 1657 / 10°C / małe zanieczyszczenie

- **2%/1 min.**

EN 1657 / 10°C / małe zanieczyszczenie

- **1%/30 min.**

SKUTECZNOŚĆ PRĄTKOBÓJCZA



EN14204 / 10°C / małe zanieczyszczenie

- **1%/60 min.** *Mycobacterium avium*

SKUTECZNOŚĆ PRZECIW PASOŻYTOM



Kokcydia / Glista świnińska

- Skuteczność jednokomórkowych pierwotniaków 20°C, **2%/120min.** (*Eimeria tenella*)
- Skuteczność jaj glisty 10°C, **3% 120min** (*Ascaris suum*)



FUMAGRI

EFFISAFE

Substancja aktywna: **Chlorocrezol & OPP (Orthofenylnfenol)**

pH równe 10 g/l: **7.39±0.5**

Składowanie: **Przechowywać w czystym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i intensywnego światła.**

Termin ważności: **2 lata od daty produkcji**

Kilco^K
SCIENCE IN SOLUTION

Dystrybutor w Polsce:
BioPoint
ul. Sadowa 4
11-034 Stawiguda
tel. 89 542 08 04

 /kilco.polska

www.kilco.pl

